



Intervention Radiology Department
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

Progress note (บันทึกการเปลี่ยนแปลง การรักษาที่สำคัญ)	Date/Time Order	Order for one day (คำสั่งครั้งเดียวใช้ได้ 1 วัน)	Order for Continuation (คำสั่งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไป)
ชื่อ..... ตึก..... HN.....AN.....		<p style="text-align: center;">Post-op order for PCD care</p> <ul style="list-style-type: none"> - Record V/S as usual. - ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ และ off IV. ได้ หาก ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ - observe bleeding หรือ hematoma บริเวณรอยเข็ม หากพบอาการให้รายงานแพทย์เจ้าของไข้ - procedural report อยู่ใน PACs. 	<ul style="list-style-type: none"> - Record content OD - flash สายด้วย NSS 5-10 ml. if content ออกน้อย - จัดวางถุงรองรับสิ่งคัดหลั่ง ให้อยู่ต่ำกว่าระดับเอว เพื่อป้องกันสิ่งคัดหลั่งไม่ให้ไหลย้อนกลับและเกิดการติดเชื้อ ระวังไม่ให้สายบิด หัก พับงอ หรือ กดทับ - สังเกตและประเมินการไหลของสิ่งคัดหลั่ง จากสายระบาย ถ้าไม่มี สิ่งคัดหลั่ง ไหลออกมาภายใน 24 ชั่วโมง ควรต้อง รายงานแพทย์เจ้าของไข้ - สังเกตภาวะแทรกซ้อน หากพบอาการ bleeding, มี ภาวะ shock, มีไข้ สูง หนาวสั่น, ปวดท้องรุนแรง, มีสิ่งคัดหลั่ง ซึมมากที่แผล หากพบอาการให้รายงาน แพทย์เจ้าของไข้ - ทำแผล 3 วันต่อครั้ง หรือทุกครั้งเมื่อ ผ้าก๊อชปิดแผลเปื้อนหรือมีสิ่งคัดหลั่งซึม ออกมา ขณะทำแผล ให้ตรวจสอบไหม ด้ายเย็บ และท่อระบายน้ำดีว่าอยู่ใน สภาพซาร์ดู ขาด หรือ เลื่อนหลุดหรือไม่ ถ้าพบว่า มีการเลื่อน หรือไหมหลุด หรือ พบว่าผิวหนัง บริเวณที่เย็บ เปื่อยยุ่ย ให้รายงานแพทย์เจ้าของไข้ เพื่อเย็บใหม่ ป้องกันไม่ให้ท่อระบายเลื่อนหลุด - Paracetamol (500 mg) 1 tab oral prn. for pain q 4-6 hr.