



Intervention Radiology Department

RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

Progress note (บันทึกการเปลี่ยนแปลง การรักษาที่สำคัญ)	Date/Time Order	Order for one day (คำสั่งครั้งเดียวใช้ได้ 1 วัน)	Order for Continuation (คำสั่งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไป)
ชื่อ..... ตึก..... HN.....AN.....		<p style="text-align: center;">Post-op order for PTBD care</p> <ul style="list-style-type: none"> - Record V/S as usual. - ให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้ตามปกติ - Paracetamol (500 mg) 1 tab oral prn. for pain q 4-6 hrs. - นัด Exchange สาย PTBD 3 mouth วันที่..... 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดวางถุงรองรับน้ำดี ให้อยู่ต่ำกว่าระดับเอว เพื่อป้องกันน้ำดีไม่ไหลย้อนกลับและเกิดการติดเชื้อ ระวังมัดกระวังไม่ให้สายบิด หัก พับงอ หรือ กดทับ - observe bile content จากสายระบาย PTBD ถ้าไม่มี bile content ไหลออกมาภายใน 24 ชั่วโมง ให้รายงานแพทย์เจ้าของ - observe bleeding หรือ hematoma บริเวณแทงสาย, ภาวะ shock, มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดท้อง รุนแรง มีน้ำดีขี้นมากที่แผล ให้รายงานแพทย์เจ้าของไข้ - ให้ Antibiotic ชนิดฉีดต่ออีก 3 วัน ตามแผนการรักษา โดยนับวันแรกคือวันถัดไปหลังทำ PTBD - ทำแผล อย่างน้อย 2 – 3 วันต่อครั้ง หรือทุกครั้งเมื่อผ้าก๊อชปิดแผลเปื้อน หรือ มีน้ำดีขี้นออกมา ขณะทำแผลให้ตรวจสอบไหม ด้ายเย็บ และท่อระบายน้ำดีว่าอยู่ในสภาพชำรุดขาด หรือ เลื่อนหลุดหรือไม่ ถ้าพบว่า มีการเลื่อน หรือ โหมหลุด หรือ พบว่า ผิวหนัง บริเวณที่เย็บ เปื่อยยุ่ย ให้รายงานแพทย์เจ้าของไข้ เพื่อเย็บใหม่ ป้องกันไม่ให้ท่อระบายเลื่อนหลุด