



Intervention Radiology Department

RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

Progress note (บันทึกการเปลี่ยนแปลง การรักษาที่สำคัญ)	Date/Time Order	Order for one day (คำสั่งครั้งเดียวใช้ได้ 1 วัน)	Order for Continuation (คำสั่งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไป)
ชื่อ..... ตึก..... HN.....AN.....		<p style="text-align: center;">Post-op order for Cholecystectomy care</p> <ul style="list-style-type: none"> - Record V/S as usual. - ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ และ off IV. ได้ หากไม่มีอาการผิดปกติใดๆ - observe bleeding หรือ hematoma บริเวณรอยเข็ม หากพบอาการให้รายงานแพทย์เจ้าของไข้ -procedural report อยู่ใน PACs. 	<ul style="list-style-type: none"> - Record content OD - flash สายด้วย NSS 5-10 ml. if content ออกน้อย - จัดวางถุงรองรับสิ่งคัดหลั่ง ให้อยู่ต่ำกว่าระดับเอว เพื่อป้องกันสิ่งคัดหลั่งไม่ให้ไหลย้อนกลับและเกิดการติดเชื้อ รมั้ดระวังไม่ให้สายบิด หัก พับงอ หรือกดทับ - สังเกตและประเมินการไหลของสิ่งคัดหลั่งจากสายระบาย ถ้าไม่มี สิ่งคัดหลั่ง ไหลออกมาภายใน 24 ชั่วโมง notify แพทย์เจ้าของไข้ - สังเกตภาวะแทรกซ้อน หากพบอาการ bleeding, มีภาวะshock, มีไข้สูง หนาวสั่น, ปวดท้องรุนแรง, มีสิ่งคัดหลั่งซึมมากที่แผล หากพบอาการให้รายงานแพทย์เจ้าของไข้ - ทำแผล 3 วันต่อครั้ง หรือทุกครั้งเมื่อผ้าก๊อชปิดแผลเปื้อนหรือมีสิ่งคัดหลั่งซึมออกมา ขณะทำแผล ให้ตรวจสอบไหม ด้ายเย็บ และท่อระบายน้ำตีว่าอยู่ในสภาพชำรุด ขาด หรือเลื่อนหลุดหรือไม่ ถ้าพบว่า มีการเลื่อน หรือไหมหลุด หรือ พบว่าผิวหนัง บริเวณที่เย็บ เปื้อน ยุ่ย ให้รายงานแพทย์เจ้าของไข้ เพื่อเย็บใหม่ป้องกันไม่ให้ท่อระบายเลื่อนหลุด - Paracetamol (500 mg) 1 tab oral prn. for pain q 4-6 hr.