

### แบบประเมินการดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอด

วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน.....

ผู้รับการประเมิน ชื่อ-สกุล.....

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ.....

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.....ปี.....เดือน

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย.....ปี.....เดือน

ประเมินเพื่อ  ประเมินปฐมนิเทศ (Orientation)  ประเมินประจำปี (Annual evaluation)

คำชี้แจง คะแนนเต็ม 60 คะแนน เท่ากับ 100%

ประเมินจากระดับความสามารถจากประสบการณ์การทำงานของพยาบาล ดังนี้

- เริ่มทำงาน-มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลติดต่อกัน 4 ปี และปฏิบัติงานในที่เดิมติดต่อกัน 2-3 ปี ต้องผ่าน  $\geq 50\%$
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลติดต่อกัน 5-7 ปี ต้องผ่าน  $\geq 60\%$
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลติดต่อกัน 8-10 ปี ต้องผ่าน  $\geq 70\%$
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลติดต่อกันมากกว่า 10 ปี ต้องผ่าน  $\geq 80\%$

ขั้นตอนปฏิบัติ	ปฏิบัติครบถ้วน 3	ปฏิบัติบางส่วน 2	ไม่ปฏิบัติ 1
<b>การป้องกันและประเมินภาวะตกเลือดหลังคลอด</b>			
1. สามารถประเมิน v/s และปริมาณเลือดออกหลังรับย้ายจากห้องคลอดหรือห้องผ่าตัด ได้ถูกต้อง			
2. สามารถประเมินการหดตัวของมดลูกและระดับยอดมดลูกได้ถูกต้อง			
3. สามารถสอนและแนะนำมารดาหลังคลอดในการนวดคลึงมดลูกได้อย่างถูกต้อง			
4. สามารถประเมินภาวะ bladder full ได้และกระตุ้นมารดาให้ปัสสาวะภายใน 6 ชม. หลังคลอดทุกครั้งที่ได้รับย้ายจากห้องคลอดหรือห้องผ่าตัด			
5. สามารถประเมินแผลฝีเย็บและ Hematoma ได้ถูกต้อง			

ขั้นตอนปฏิบัติ	ปฏิบัติครบถ้วน 3	ปฏิบัติบางส่วน 2	ไม่ปฏิบัติ 1
<b>การดูแลรักษาเมื่อมีภาวะเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอด (มารดาคลอดทางช่องคลอดเสียเลือด <math>\geq 400</math> ซีซี /มารดาผ่าตัดคลอดเสียเลือด <math>\geq 800</math> ซีซี)</b>			
1. สามารถประเมินอาการและ v/s โดยใช้ SOS score ได้			
2. ทำการนวดคลึงมดลูกและกดไล่เลือดทุกครั้ง			
3. เจาะเลือดเพื่อตรวจ Hct ทันที			
4. สามารถประเมินหาสาเหตุการตกเลือดตามหลัก 4T ได้ถูกต้อง รวดเร็วและทำการการแก้ไขได้ถูกต้อง			
5. ใส่สายสวนปัสสาวะทุกครั้ง			
6. สามารถรายงานสูติแพทย์ตามหลัก SBAR เพื่อพิจารณาให้ยาเพิ่มการหดตัวของมดลูกหรือปรับตามแผนการรักษาเพิ่มเติม ได้รวดเร็วทันเวลาและมีประสิทธิภาพ			
<b>การพยาบาลมารดาตกเลือดหลังคลอด</b>			
1. สามารถบริหารยาช่วยมดลูกหดตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม			
2. กรณีให้ยา Methergine วัดความดันโลหิตก่อนให้ยาทุกครั้ง โดยคงให้ยาในรายที่ค่าความดันโลหิต $\geq 140/90$ mmHg			
3. สามารถทำ Bimanual uterine compression ในรายมดลูกหดตัวไม่ดีได้อย่างถูกต้อง			
4. สามารถประเมินปริมาณเลือดออกและภาวะช็อกจากการสูญเสียเลือดได้ และทำการนวดคลึงมดลูกทุก 30 นาที – 1 ชม. จนกว่าอาการจะคงที่			
5. สามารถเตรียมอุปกรณ์และช่วยแพทย์ทำหัตถการได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจภายใน อุปกรณ์ใส่ Intrauterine balloon tamponade			

ขั้นตอนปฏิบัติ	ปฏิบัติครบถ้วน 3	ปฏิบัติบางส่วน 2	ไม่ปฏิบัติ 1
6. สามารถติดต่อประสานห้องผ่าตัดและเตรียมผ่าตัดผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันเวลา			
7. สามารถเจาะเลือดตรวจหาความผิดปกติจากการตกเลือด และจองเลือดได้ถูกต้องตามคำสั่งการรักษา			
8. สามารถให้เลือดตามมาตรฐานการให้เลือดได้ถูกต้อง และประเมินอาการผิดปกติจากการแพ้เลือดได้			
9. สามารถบันทึกการพยาบาลและส่งเวรต่อได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม			